PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION D'ÉPINÉPHRINE

- **Une allergie aux piqûres d'insecte produit le plus souvent un état de choc.**
- **Une allergie alimentaire produit le plus souvent une détresse respiratoire.**

SIGNES ET SYMPTÔMES

DÉTRESSE RESPIRATOIRE

- Difficulté respiratoire visible ;
- Respiration bruyante ;
- Cyanose (coloration bleuâtre).

OU

ENFLURE VISIBLE DE LA LANGUE

OU

DÉFAILLANCE CIRCULATOIRE

- Perte de conscience ;
- Faiblesse importante ;
- Sudation importante ;
- Pouls rapide ;
- Altération de l'état de conscience.



INJECTION D'ÉPINÉPHRINE

Appeler le 911

Si, après 15 minutes, l'état de la victime ne s'améliore pas ou s'aggrave, refaire une injection d'épinéphrine.

Santé et Services sociaux Québec

CNESST

INFORMATION À TRANSMETTRE au technicien ambulancier paramédic ou au service médical consulté

Identification

Nom de la personne exposée : _____

Adresse : _____

_____ N° de téléphone : _____

Événement

Date : _____ Heure approximative de la réaction : _____h_____min

Signes et symptômes : _____

_____

_____

Interventions

Heure approximative de l'injection d'épinéphrine : _____h _____min

Effets de l'épinéphrine : ☐ Amélioration ☐ Aucun

Heure d'injection de la dose supplémentaire : _____h _____min

Observations : _____h _____min

_____h _____min

_____h _____min

Nombre de doses d'épinéphrine données : _____ doses

La victime se savait-elle allergique ? ☐ Oui ☐ Non

Nom du secouriste : _____

OU

Nom de la personne qui a administré l'épinéphrine : _____

Téléchargez l'application mobile sur l'App Store et Google play !

Secourisme

secouristeenmilieudetravail.com

IMPORTANT :

Garder l'aide-mémoire dans la trousse de premiers secours et le remplir au besoin.

DC100-489-7 (2016-02)